

Внимание!

Информация об ухудшении эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Псковской области.

В период с 05 по 12 июля 2021 года на территории Псковской области сложилась стойкая неблагополучная обстановка по африканской чуме свиней (АЧС), в указанный период инфекция выявлена на территории 5 муниципальных районов региона: Порховского, Дедовичского, Псковского, Дновского и Струго-Красненского.

Вирус был выявлен как в дикой фауне, так и среди поголовья домашних свиней, в том числе на промышленном предприятии IV уровня зоосанитарной защиты (компартмента).

По состоянию на 12:00 часов 13.07.2021 на территории Псковской области подтверждено 8 активных случаев АЧС:

1. В дикой фауне Дедовичского района северо-восточнее д. Крутец;
2. В ЛПХ Порховского района в д. Моржовино;
3. В ЛПХ Струго-Красненского района в д. Залазы;
4. В инфицированном объекте (трупы свиней) вблизи д. Моржовино Порховского района;
5. В ООО «ПсковАгроИнвест» Порховского района в д. Полоное.
6. В ЛПХ Псковского района в д. Сорокино;
7. В дикой фауне Дновского района вблизи д. Выскодь;
8. В дикой фауне Порховского района между д. Лашково и д. Дубье.

Расстояние от ближайшего к Ленинградской области очага АЧС составляет:

- до административных границ Лужского района Ленинградской области – 42 км;
- до ближайшего промышленного свинокомплекса Ленинградской области ООО «ИДАВАНГ Луга» - 74 км.

Африканская чума свиней (АЧС).

Африканская чума свиней – высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов, характеризующаяся внезапностью появления, быстрым распространением. Болезнь в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Возбудитель – вирус. Устойчив во внешней среде.

Вирус АЧС проникает в организм животных аэрогенным (воздушно- капельным), алиментарным путем, через поврежденные слизистые, кожные покровы, конъюнктиву. Заражение возможно через обсемененный возбудителями инвентарь, предметы обихода, которые были использованы в уходе за больными свинками, некачественные комбикорма. Не прошедшие термическую обработку продукты питания, которые скармливают животным, также могут стать причиной инфицирования вирусом АЧС.

Источником распространения АЧС являются инфицированные больные особи, животные во время инкубационного периода, корма, транспортные средства, зараженные продукты животноводства. Промежуточными разносчиками болезни - грызуны, дикие птицы, кровососущие насекомые.

Симптомы африканской чумы свиней.

Интенсивность проявления клинической симптоматики зависит от типа вируса, количества вирионов в организме животных, общего физиологического состояния, реакции иммунной системы, тяжести течения инфекции. Продолжительность инкубационного периода составляет от двух 2 до семи 7 суток.

Важно! При чуме свиней симптомы могут варьироваться, при этом в любом случае АЧС заканчивается гибелю зараженных животных.

Африканская чума свиней может протекать сверхостро, остро, реже — хронически. Как правило, первые симптомы проявляются на 2—5-й день с момента инфицирования. Если диагностирована чума, у свинок симптомы проявления при молниеносном течении болезни могут быть малозаметными. Больные особи без каких-либо характерных проявлений симптомов гибнут в течение 24–48 часов.

Признаками АЧС являются:

- резкое повышение температуры до 41,5-42° С;
- увеличение региональных лимфоузлов;
- снижение аппетита, отказ от кормов;
- парезы, паралич задних конечностей;
- нарушение пищеварительных процессов;
- анемия, синюшность (цианоз) слизистых;
- затрудненное, поверхностное дыхание, одышка, кашель, рвота;
- подкожные отеки, кровоподтеки;
- пневмония;
- резкий падеж.

Больные животные выглядят апатичными и слабеют, им становится тяжело подниматься на ноги, нарушается координация движений. При пальпации лимфоузлов отмечают сильную болезненность. Аппетит понижен или отсутствует совсем.

Характерный симптом, который проявляется у зараженных АЧС – появление темно-фиолетовых с красным отливом пятен на внутренней поверхности бедра, животе, шее, конечностях, боках, спине, пятаке, у основания ушных раковин.

Лечения нет! В случае вспышки болезни в очаге вводятся ограничительные мероприятия (карантин), что приведет к экономическому ущербу хозяйствующих субъектов и бюджетов всех уровней.

В целях сохранения эпизоотического благополучия территории Ленинградской области напоминаем гражданам об **основных правилах недопущения заноса инфекции** в личные подсобные хозяйства:

Содержать:

-имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях в огороженных местах, безвыгульно;

- использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных работ.

Не допускать:

- свободного выгула свиней из помещений;

- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;

- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.

Для человека опасности АЧС не представляет.

При подозрении на заболевание сообщить в государственную ветеринарную службу Лужского района, тел. горячей линии 8-921-977-14-00 (круглосуточно).